

ИНФЕКЦИИ ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ



ЕЖЕГОДНО

448 000 000

НОВЫХ СЛУЧАЕВ ИЗЛЕЧИМЫХ ИППП

СИФИЛИС, ГОНОРЕЯ, ХЛАМИДИОЗ И ТРИХОМОНИАЗ



15-49 ЛЕТ

ИППП ЯВЛЯЮТСЯ
ОСНОВНОЙ ПРЕДОТВРАТИМОЙ
ПРИЧИНОЙ БЕСПЛОДИЯ,
ОСОБЕННО У ЖЕНЩИН.



ПРИ ОТСУТСТВИИ ЛЕЧЕНИЯ
ИППП МОГУТ ИМЕТЬ СЕРЬЕЗНЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ
РЕПРОДУКТИВНОГО
ЗДОРОВЬЯ И ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
МАТЕРИ И РЕБЕНКА.

ОСНОВНЫМ ПУТЕМ ПЕРЕДАЧИ ВЕНЕРИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛОВОЙ, НО ПРИ НЕКОТОРЫХ ИНФЕКЦИЯХ ВОЗМОЖНЫ И ДРУГИЕ ПУТИ ПЕРЕДАЧИ: **КОНТАКТНО-БЫТОВОЙ, ВНУТРИУТРОБНЫЙ, ЧЕРЕЗ КРОВЬ.**

ПЕРВЫМИ ПРИЗНАКАМИ ИНФЕКЦИИ МОГУТ БЫТЬ ВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ МОЧЕПОЛОВЫХ ПУТЕЙ, ЯЗВОЧКИ, ПОКРАСНЕНИЯ, ПУЗЫРЬКИ, МИКРОТРЕЩИНЫ НА КОЖЕ ИЛИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ, ЗУД ИЛИ ЖЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ МОЧЕИСПУСКАНИЯ ИЛИ ПОЛОВОГО КОНТАКТА.



ВАЖНО ОТМЕТИТЬ! ПРИ ИНФЕКЦИЯХ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ, **НЕ ПРОИСХОДИТ САМОИЗЛЕЧЕНИЯ** ОРГАНИЗМА. ЕСЛИ ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ СИМПТОМЫ ИСЧЕЗАЮТ – ЭТОГО ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ ПЕРЕХОДА ЗАБОЛЕВАНИЯ В СКРЫТУЮ ФОРМУ.



КОМУ НЕОБХОДИМО СДАТЬ АНАЛИЗЫ?

ЛЮБОМУ ЧЕЛОВЕКУ, КОТОРЫЙ ХОТЯ БЫ РАЗ В ЖИЗНИ ВСТУПАЛ В НЕЗАЩИЩЕННЫЙ КОНТАКТ БЕЗ ПРЕЗЕРВАТИВА



ИНФИЦИРОВАНИЕ НЕКОТОРЫМИ ТИПАМИ ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА МОЖЕТ ПРИВОДИТЬ К РАЗВИТИЮ РАКА ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ, В ЧАСТНОСТИ, РАКА ШЕЙКИ МАТКИ У ЖЕНЩИН.



НАДЕЖНЫМИ МЕРАМИ ПРОФИЛАКТИКИ ИППП ЯВЛЯЮТСЯ ВОЗДЕРЖАНИЕ ОТ ПОЛОВЫХ КОНТАКТОВ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕЗЕРВАТИВА ПРИ КАЖДОМ ПОЛОВОМ КОНТАКТЕ И РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ НА ИППП.