

9 ФАКТОРОВ О ВРЕДЕ ПЕРВЫХ АБОРТОВ



1. Привычные выкидыши

Организм девушки запоминает течение первого вынашивания, и при последующих беременностях он ему всячески следует.



2. Нарушение фертильности

После аборта у женщины часто теряется способность к зачатию.



3. Ожирение

Гормональные нарушения при прерывании беременности приводят к увеличению массы



4. Психические нарушения

Почти у 60% женщин, совершивших аборт, могут возникнуть: раздражительность, чувство вины, самоупреки, изменения настроения, депрессия, беспричинные слезы, страхи, кошмары. Часто это сопровождается нарушением сердечного ритма, неустойчивостью артериального давления, мигренью, желудочно-кишечными проблемами.



5. Повреждение шейки матки

Довольно распространенное после первого аборта последствие. Маточную шейку впервые раскрывают принудительно, поэтому она теряет эластичность и тонус.



6. Инфекционное заражение

Из-за гормональных нарушений и оперативных вмешательств высок риск развития инфекционных заболеваний.



7. Онкологические заболевания

Гормональный сбой, спровоцированный аборт, повышает вероятность развития рака шейки матки, цервикального канала, брюшной полости или щитовидной железы.

У девушек, переживших аборт до 18-летнего возраста, вероятность развития онкологии груди возрастает на 150%.



8. Если девушка имеет отрицательный резус

Для нее опасно не только само прерывание, но и осложнения после аборта. Опасность прерывания при отрицательном резус-факторе заключается в дополнительных факторах, одним из которых является высокий риск развития гемолитической патологии у плода при следующем зачатии и вынашивании.



9. Геморрой

Появление геморроя после аборта часто связано с инструментальным вмешательством в женский организм во время мини-аборта или хирургического аборта.

